



Information til forældre - Tuberkulose

Der har været tilfælde af tuberkulose _____

Tuberkulose skyldes infektion med tuberkulosebakterier og sidder hyppigst i lungerne, men kan også give sygdom uden for lungerne, hos børn ofte i lymfeknuderne på halsen. Tuberkulosebakterier kan ligge latent i kroppen i mange år uden at give sygdom.

Om smitte

Personer med tuberkulose i lungerne og hoste kan være smitsomme. Tuberkulose smitter ved dråbeinfektion, og overføres med luftvejssekret eller ved dråber, der hostes eller nyses ud i luften. Tuberkulose er langt mindre smitsom end andre luftvejsinfektioner. Normalt overføres smitte kun efter nær og langvarig kontakt. Børn smittes overvejende af voksne. I modsætning til voksne smitter børn med tuberkulose sædvanligvis ikke, da børn udskiller meget få bakterier.

Om forebyggelse

Børn og voksne bør hoste i et stykke papir eller i ærmet. God ventilation/udluftning flere gange dagligt og almindelig grundig rengøring af lokaler mindsker smitterisikoen.

Alle børn tilbydes vaccination mod tuberkulose (BCG) ved fødslen.

Symptomer

Inkubationstid: Måneder til år.

De fleste infektioner hos børn og unge giver ingen eller kun forbigående symptomer. Når tuberkulosesygdom udvikles, optræder symptomerne oftest 1-6 måneder efter infektionen og består i feber, vægttab eller manglende vægtøgning, hoste, nattesved og kuldegysninger. Sjældnere kan der optræde symptomer på infektion i lymfeknuder, knogler, led, hud og undertiden meningitis.

Behandling

Behandlingen er effektiv, men langvarig og varer i 6 måneder. Der gives også forebyggende behandling til børn, som er smittede, men ikke syge.

Om forholdsregler ved sygdomstilfælde

Landslægeembedet har ansvaret for at iværksætte foranstaltninger ved tilfælde af tuberkulose og vil i samarbejde med tuberkulosesygeplejerske eller læge foretage en vurdering af behov for undersøgelse af kontakter. Ved tuberkulose hos et barn bliver søskende, forældre og nære kontakter undersøgt for, om de har sygdommen og således kan være smitekilder.

Komme i institution

Ved påvist tuberkulose hos et barn foretages en individuel vurdering af, hvornår barnet kan komme i institution. De fleste børn med tuberkulose er ikke smittefarlige. Landslægen rådgiver.