

Bylder - Information til forældre

Har der været tilfælde af bylder? Som forældre kan du være med til at begrænse smitten.

Læs denne vejledning, og informer personalet i daginstitutionen, hvis dit barn viser tegn på bylder.

Bylder

En byld er en ophobning af pus i underhuden, forårsaget af en infektion. Den viser sig ofte som en rød, hævet og smertefuld bule i huden. Bylder kan opstå overalt på kroppen og er oftest forårsaget af stafylokokker (bakterier), der er trængt igennem en lille skade på huden.

Om smitte

Smitte overføres med væske fra bylden (pus) via hænder eller genstande. Spredning til andre sker især inden for husstanden.

Smitteperiode: Smitter fra bylden begynder at væske, til bylden er tørret ind.

Smitstoffer (fx stafylokokker) kan overleve i miljøet, fx i møbler, sengetøj eller på legetøj meget længe (måneder).

Om forebyggelse

Korrekt håndhygiejne og en god rengøringsstandard er vigtig for forebyggelsen af smittespredning. Væske fra bylder er fyldt med bakterier, og da små børn ikke har forståelse for renlighed og hele tiden vil berøre sårene, er det vigtigt at overholde reglerne for, hvornår børnene må komme i institution – også selv om børnene ikke er særlig syge – barnet må komme i institution når bylden er tørret ind.

Symptomer

Inkubationstid: Få dage.

På et afgrænset område er der ømhed, rødme, hævelse og senere pusansamling. Ved større bylder kan der være utilpashed eller feber.

Behandling

Bylder kræver normalt behandling via sundhedsvæsenet.

Om forholdsregler ved sygdomstilfælde

Hvis der påvises MRSA (methicillin-resistente stafylokokker) i en prøve fra bylden gælder særlige regler.

Komme i institution

Når byldeerne er tørret ind.