

Information til forældre

Fåresyge

Der har været tilfælde af fåresyge. Læs denne vejledning, og informer personalet, hvis dit barn viser tegn på fåresyge.

Fåresyge (parotitis epidemica) er en børnesygdom forårsaget af virus, som giver betændelse i spytkirtlerne.

Vaccination mod fåresyge indgår i børnevaccinationsprogrammet. Sygdommen er blevet sjælden pga. MFR-vaccination.

Om smitte

Smitten spredes via hænder eller genstande, der er forurenede med spyt, eller dråber, som hostes eller nyses ud i luften.

Smitteperiode: fra 5 dage efter smitteudsættelse til 5 dage efter sygdommens begyndelse.

Symptomer

Inkubationstid: 2-3 uger.

Fåresyge viser sig typisk ved let feber, hævelse og ømhed foran øret. Symptomerne svinder oftest inden for 1 uge.

Behandling

Der er ingen behandling for sygdommen.

Om forholdsregler ved sygdomstilfælde

Landslægeembedet har ansvaret for at iværksætte foranstaltninger ved tilfælde af fåresyge.

Komplikationer

Hos drenge efter puberteten kan der opstå smertefuld betændelse i testiklerne. En anden komplikation til fåresyge er en form for hjernehindebetændelse, som almindeligvis er ufarlig, men dog kræver indlæggelse på sygehus.

Komme i institution

Tidligst 6 dage efter sygdommens begyndelse.