

Fåresyge - Information til forældre

Har der været tilfælde af fåresyge? Som forældre kan du være med til at begrænse smitten.

Læs denne vejledning, og informer personalet i daginstitutionen, hvis dit barn viser tegn på fåresyge.

Fåresyge

En børnesygdom forårsaget af virus, som giver betændelse i spytkirtlerne. Vaccination mod fåresyge indgår i børnevaccinationsprogrammet, og sygdommen er blevet sjælden på grund af MFR-vaccination.

Om smitte

Smitten spredes via hænder eller genstande, der er forurenet med spyt, eller dråber, som hostes eller nyses ud i luften. Smitteperiode: Fra 5 dage efter smitteudsættelse til 5 dage efter sygdommens begyndelse.

Om forebyggelse

Vaccination mod fåresyge er en del af det grønlandske børnevaccinationsprogram.

Symptomer

Tiden fra man bliver smittet til man får symptomer: 2-3 uger. Fåresyge viser sig typisk ved let feber, hævelse og ømhed foran øret. Symptomerne svinder oftest inden for 1 uge.

Om forholdsregler ved sygdomstilfælde

Landslægeembedet har ansvaret for at iværksætte foranstaltninger ved tilfælde af fåresyge.

Behandling

Der er ingen behandling for sygdommen.

Komplikationer

Hos drenge efter puberteten kan der opstå smertefuld betændelse i testiklerne. En anden komplikation til fåresyge er en form for hjernehindebetændelse, som almindeligvis er ufarlig, men dog kræver indlæggelse på sygehus.

Komme i institution

Tidligst 6 dage efter sygdommens begyndelse.