



## Anbefalinger til personale i hjemmepleje og hjemmesygepleje ved mistænkt eller påvist COVID-19 hos borger

Anbefalingerne retter sig mod personale i hjemmepleje og hjemmesygepleje og omhandler personalets forholdsregler og adfærd i forbindelse med pleje og behandling af borgere i kommunerne ved påvist eller mistænkt COVID-19. Anbefalingerne opdateres løbende i takt med udviklingen, og det anbefales at holde sig opdateret på nun.gl.

### Formål

At forebygge spredning af COVID-19 mellem borgere og personale, personalet imellem og mellem personale og dennes familie via personalets hænder, udstyr og/eller arbejdsdragt/arbejdstøj.

BOTILBUD	Personalehåndtering af borger med mistænkt eller påvist COVID-19	
	Sædvanlige forhold	Alternativer ved kritisk mangel på værnemidler
Borgerplacering	Borgeren bør opholde sig i eget hjem, minimere kontakt med andre og anvende separat bad og toilet, hvis det er muligt.	Som sædvanligt.
Håndhygiejne	<ul style="list-style-type: none"><li>Håndhygiejne er den vigtigste forholdsregel til forebyggelse af kontaktsmitte.</li><li>Hånddesinfektion (30 sek.) udføres, når hænderne er rene og tørre.</li><li>Håndvask (60 sek.) udføres ved synlig eller våd forurening af hænderne og efterfølges altid af hånddesinfektion.</li></ul> Håndhygiejne udføres: <ul style="list-style-type: none"><li>før og efter kontakt med borgeren og dennes omgivelser</li><li>før rene opgaver og efter urene opgaver</li><li>efter brug/skift af handsker (og andre værnemidler)</li></ul> Borgeren og bofæller informeres og instrueres i omhyggelig håndhygiejne.	Som sædvanligt.
Værnemidler, generelt	Værnemidler er udstyr personalet bruger for at: <ul style="list-style-type: none"><li>Beskytte personalet imod smitte med mikroorganismer.</li><li>Forhindre at personalet videregiver smitte.</li></ul> Værnemidler påføres inde i borgerens bolig.	Som sædvanligt. <ul style="list-style-type: none"><li>Da der i øjeblikket er forsyningsvanskeligheder, bør værnemidler opbevares centralt i aflåst depot. Der kan lokalt udarbejdes retningslinjer for mest hensigtsmæssig opbevaring under de specifikke lokale forhold.</li></ul>



<b>BOTILBUD</b>		
<b>Personalehåndtering af borger med mistænkt eller påvist COVID-19</b>		
	<b>Sædvanlige forhold</b>	<b>Alternativer ved kritisk mangel på værnemidler</b>
Handsker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handsker anvendes ved alle pleje- og behandlingsopgaver i borgerens bolig, samt ved direkte kontakt med udstyr, genstande og snavsetøj.</li> <li>• Handsker er til engangsbrug og må ikke vaskes eller desinficeres.</li> <li>• Forurenede handsker kan være årsag til smittespredning.</li> <li>• Handsker skiftes mellem forskellige opgaver og ved forurening.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Såfremt der er mangel på handsker, er korrekt håndhygiejne et alternativ i mange situationer. Dette gælder dog ikke ved kontakt med patientens udskillelser. Her skal der altid anvendes handsker.</li> <li>• Handsker må ikke vaskes, desinficeres eller genbruges.</li> </ul>
Arbejdsdragt, plastforklæde og engangs-overtrækskittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbejdsdragt anvendes iht. Sundhedsstyrelsens "Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren"<sup>1</sup>.</li> <li>• Plastforklæde med lange ærmer/væskeafvisende engangs-overtrækskittel anvendes ved direkte kontakt med borger, udstyr og snavsetøj eller kontakt med inventar, hvor der er risiko for, at arbejdsdragten forurenes.</li> <li>• Ærmer skal slutte tæt ved håndleddene.</li> </ul>	<p>Arbejdsdragt som sædvanligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plastforklæde med lange ærmer kan anvendes i stedet for overtrækskittel.</li> <li>• Plastforklæde uden ærmer kan anvendes ved simple opgaver (se eksempler sidst i dokumentet).</li> <li>• Hvis ærmerne har kontakt med borger eller forurenes, udvides området for håndhygiejne.</li> <li>• Flergangs-overtrækskittel med lange ærmer, af stof, kan anvendes, hvis plastforklæder ikke kan fås. Vaskes ved 80°C.</li> <li>• Samme engangs- eller flergangskittel kan bruges flere gange til den enkelte borger - evt. suppleret med et plastforklæde uden ærmer ved risiko for stænk og sprøjt.</li> </ul>
Kirurgisk maske, beskyttelsesbriller og visir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kirurgisk maske (type II) og beskyttelsesbriller/visir anvendes ved tæt kontakt (under 2 m) med beboer.</li> <li>• Kirurgisk maske (type I) kan anvendes til borgeren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flergangsvisir (full-face) kan anvendes ved forsyningsproblemer som erstatning for kirurgisk maske og beskyttelsesbriller. Flergangsvisir rengøres med vand og sæbe/rengøringsmiddel og desinficeres (se under udstyr). Der anvendes handsker ved rengøring og desinfektion af visiret.</li> <li>• Engangsbeskyttelsesbriller kan erstattes med flergangsbeskyttelsesbriller og rengøres og desinficeres som flergangsvisir.</li> <li>• Borgeren med symptomer, og som kan kooperere, iføres en kirurgisk maske (type I) ved besøg af hjemmeplejen/hjemmesygeplejen. Personalet anvender i denne situation ingen</li> </ul>

<sup>1</sup> <https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2011/Publ2011/BOS/Arbejdsdragt/Vejledning-om-arbejdsdragt-inden-for-sundheds--og-plejesektoren.ashx>



		ansigtsbeskyttelse fraset situationer med risiko for stænk og sprøjt til ansigtet. Borgerens maske kan med fordel anbringes i en boks, når den ikke anvendes. Masken kan genbruges hos borgeren, der allerede er inficeret med COVID-19, men skal skiftes, hvis den er våd eller synlig forurenet.
Patientens udskillelser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undgå berøring (brug værnemidler)</li> <li>• Urin, afføring, blod, pus eller lignende skylles direkte ud i toiletet.</li> </ul>	Som sædvanligt.
Udstyr og andre genstande	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anvend udstyr og hjælpemidler, som kan rengøres og desinficeres.</li> <li>• Udstyr skal så vidt muligt kun anvendes til den enkelte borger.</li> <li>• Alternativt anvendes engangsudstyr.</li> <li>• Udstyr og hjælpemidler, som genanvendes, skal rengøres med vand og sæbe og desinficeres, fx m. ethanolbaseret alkohol 70-85 % v/v.</li> <li>• Opmærksomhed bør rettes mod hvilke desinfektionsmidler, udstyret/genstanden kan tåle. Producentens anvisninger følges.</li> <li>• Flergangsudstyr, der skal genbehandles uden for borgerens hjem emballeres forsvarligt og medtages til dekontaminator/ instrumentopvaskemaskine.</li> </ul>	<p>Principper som sædvanligt.</p> <p>Alternative produkter til desinfektion af udstyr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kvaternære ammoniumforbindelser</li> <li>• triamin</li> <li>• klor (1000 ppm)</li> </ul>
Affald	Affald emballeres og kasseres som vanligt, og der udføres håndhygiejne.	Som sædvanligt.
Tøj og linned	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snavsetøj håndteres så lidt som muligt.</li> <li>• Så vidt muligt vaskes håndklæder, sengelinned og undertøj ved min. 80°C, og det øvrige tøj om muligt ved 60°C.</li> <li>• Der udføres håndhygiejne efter håndtering af snavsetøj.</li> <li>• Såfremt der anvendes eksternt vaskeri, følges virksomhedens anbefalinger.</li> </ul>	Som sædvanligt.
Rengøring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengøring med alm. rengøringsmidler (vand og sæbe) er tilstrækkeligt.</li> <li>• Særligt fokus på kontaktpunkter, fx håndtag, vandhaner, toiletsæde, toiletskylleknop, kontakter til lys etc.</li> </ul>	<p>Principper som sædvanligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For at spare på værnemidler kan hjemmeplejen i forbindelse med plejeopgaver udføre rengøring af området omkring borgeren (sengebord, kontaktpunkter mv. inden for 2 m afstand).</li> <li>• Evt. rengøringspersonale anvender handsker og plastforklæde til</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toiletområde og toilet rengøres til sidst.</li><li>• Brugte klude kasseres eller vaskes ved minimum 80°C efter brug.</li><li>• Hjemmeplejen, der forestår rengøringen, skal anvende handsker og overtrækskittel/plastforklæde samt, hvis det er inden for 2 m afstand af borgeren, maske og øjenbeskyttelse. Maske og øjenbeskyttelse kan erstattes af full-face visir.</li></ul>	rengøring af området > 2 m fra borgeren.
--	---	--

<b>Eksempler</b>	
Tandbørstning	Hjemmeplejen, der skal udføre tandbørstningen, befinder sig typisk indenfor 2 m afstand fra borgeren, hvorfor der anvendes samtlige værnemidler (se ovenfor). Hvis borgeren skal understøttes i tandbørstning, er det derimod muligt at holde afstand på 2 m og værnemidler er ikke nødvendige. Husk god håndhygiejne!
Personlig pleje og forflytninger	Ved personlig pleje og forflytninger må hjemmeplejen vurdere, om plejen omfatter tæt kontakt under 2 m, samt vurdere om der er risiko for at få sekreter fra patienten i ansigtet.
Servering af mad	Ved servering af mad er det muligt at holde en afstand på 2 m, og placere sig i forhold til borgeren, således at borgeren ikke hoster hjemmeplejen i ansigtet. Her er det ikke nødvendigt at anvende handsker. Husk god håndhygiejne!
Sårpleje	Brug af værnemidler i forbindelse med sårpleje vil afhænge af, hvor på kroppen såret er. Eksempelvis vil sårpleje på ryggen typisk ikke kræve brug af maske og øjenbeskyttelse, medmindre der er risiko for stænk og sprøjt til ansigtet. Det vil dog være nødvendigt at anvende plastforklæde/engangsovertrækskittel for at beskytte arbejdsdragten. Endvidere anvendes handsker. Pleje af et sår på en tå vil kræve en vurdering af de fysiske forhold og borgerens størrelse. Hvis opgaven varetages inden for 2 m fra borgerens mund/næse/luftveje anvendes samtlige værnemidler.

### **Baggrund. Principper og detaljer vedr. værnemidler**

#### **Smittemåder:**

Coronavirus spreder sig ved person-til-person smitte. Der er set smitte til sundhedspersoner og smitte mellem familiemedlemmer og andre kontakter. Smitte sker hovedsageligt ved host og nys i ansigtet på den raske (dråbesmitte) inden for 2 m eller ved kontaktsmitte via sekret på hænderne eller overflader (fx håndtag, knapper mv.). Det er derfor vigtigt at udføre hyppig håndhygiejne og holde hænderne fra ansigtet.



## Principper for pleje og behandling af borger med bekræftet eller mistænkt COVID-19 i eget hjem

### Hvornår skal der anvendes værnemidler i forbindelse med påvist eller mistænkt COVID-19?

Ved tæt kontakt inden for 2 m fra borgeren. Ifølge Landslægeembedet og de danske Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren ved dråbesmitte er afstanden 1 m til patienten, men da udenlandske anbefalinger fra WHO og ECDC i forbindelse med COVID-19 er 2 m ud fra et forsigtighedsprincip, har vi valgt at gøre det samme i Grønland.

### Hvornår behøver man ikke værnemidler eller kan anvende samme værnemidler ved kontakt med flere borgere?

Hvis der blot skal gives en besked eller tales med borgeren, kan dette ske uden værnemidler, når afstand er  $\geq 2$  m.

### Sådan gør du – vigtige principper

<p><b>Arbejdstilrettelæggelse</b></p> <p>Arbejdet planlægges således, at personalet begynder med den rene opgave og slutter med den mest urene opgave.</p> <p>En ren opgave er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• En arbejdsopgave, hvor man vil undgå at forurene udstyr, personer eller fødevarer.</li><li>• En arbejdsopgave, hvor man arbejder med rent udstyr, dvs. at udstyret er rengjort og desinficeret.</li><li>• Ved en ren opgave håndteres rent udstyr med rene hænder og placeres på rene overflader.</li><li>• Forurenes det rene udstyr, fx hvis det tabes på gulvet, skal det håndteres som urent - kasseres eller sendes til vask og desinfektion.</li></ul> <p>En uren opgave er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• En arbejdsopgave, hvor der er risiko for en høj grad af forurening, fx bleskift eller hjælp til toiletbesøg.</li><li>• En arbejdsopgave, hvor der er risiko for, at man selv kan blive forurenet, eller man kan forurene andre eller omgivelserne.</li></ul>	<p><b>Generelt om håndhygiejne</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Håndhygiejne udføres umiddelbart før rene opgaver, umiddelbart efter urene opgaver og efter brug af handsker. Se mere om rene og urene opgaver nedenfor.</li><li>• God håndhygiejne forudsætter, at personalet har kortklippede negle uden neglelak og neglesmykker, ikke bærer ringe, ure, armbånd eller andre smykker på hænder og underarme, bærer korte ærmer og har en intakt hud. Armskinner og lignende hindrer god håndhygiejne og kan ikke anvendes ved pleje- og behandlingsopgaver i sundheds- og plejesektoren.</li><li>• Hånddesinfektion anvendes på rene og tørre hænder og udføres ved at gnide hånddesinfektionsmidlet ind i huden, indtil tørhed opnås. Der skal anvendes så stor en mængde hånddesinfektionsmiddel, at hænder og håndled kan indgvides og holdes fugtige i 30 sekunder. Hånddesinfektion udføres med håndsprit 70-85 % v/v.</li><li>• Ved håndvask skylles hænderne først, herefter indgvides sæben i 15-20 sekunder, sæben skylles af og til sidst tørres hænderne. Hele processen tager 60 sekunder.</li></ul>
<p><b>Påtagning af værnemidler sker på følgende måde og rækkefølge</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Et plastforklæde med lange ærmer eller engangsovertrækskittel skal dække kroppen, fra hals til knæ og ud til håndled og være tætsluttende ved håndledet. Plastforklædet/engangsovertrækskitlen lukkes på ryggen.</li><li>• Ved anvendelse af en kirurgisk maske fastgøres bånd eller elastik</li></ul>	<p>Aftagning af værnemidler sker på følgende måde og rækkefølge</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Handskerne er det første, der tages af. Ydersiden af handskerne er forurenet. Derfor tages fat i siden af den ene handske, handsken trækkes af, og den sidste handske krænges udover. Handskerne kasseres, og der udføres håndhygiejne.</li><li>• Herefter fjernes plastforklædet med lange</li></ul>



<p>midt på hoved og hals, næseklemmen til næseryg tilpasses og masken tilpasses ansigtet og under hagen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beskyttelsesbriller eller visir anbringes over øjne og ansigt og tilpasses.</li><li>• Handsker skal trækkes ud over plastforklædets/kitlens ærmer.</li></ul>	<p>ærmer/engangsovertrækskitlen ved at løsne i hals og evt. talje. Kitlen holdes væk fra kroppen og rulles sammen uden at ydersiden berøres. Kitlen/plastforklædet med lange ærmer kasseres, og der udføres håndhygiejne.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beskyttelsesbriller eller visir fjernes ved at berøre stængerne og de kasseres, hvis det er engangsudstyr. Såfremt visiret er flergangsvisir, rengøres dette således: 1) Påtagning af rene handsker, 2) rengøring med vand og sæbe eller rengøringsserviet, 3) aftørring med ethanolbaseret alkohol 70-85 % v/v.</li><li>• Der udføres håndhygiejne og evt. maske kan fjernes. Det er vigtigt at undgå berøring med ydersiden af masken. Masken kasseres, og der udføres håndhygiejne. Personalet skal være grundigt instrueret i på- og aftagning samt korrekt brug af værnemidler.</li></ul>
<p><b>Øvrige hygiejniske forhold</b></p> <p><b>Køkken</b> Det anbefales at skifte karklude og viskestykker dagligt</p> <p><b>Håndklæder</b> Det anbefales at der anvendes papirhåndklæder ved fællesarealer samt fællestoiletter – hvis der bruges fælles håndklæder i fællesarealerne bør disse skiftes dagligt.</p> <p><b>Personlig hygiejne ved manglende rindende vand</b> Hvis der anvendes vaskebalje pga manglende rindende vand eller ved behov for sengebade, skiftes balje mellem beboere og med skift af vaskevand undervejs.</p>	

## Til ledelsen

### Organisering af arbejdet og personaleallokering ved forsyningsvanskeligheder

Ved mangel på værnemidler kan en person tildeles flere opgaver (fx både pleje- og rengøringsopgaver), således at der kun bruges et sæt værnemidler.

Personale, der tilhører sårbare grupper jf. Landslægeembedets liste, kan eventuelt allokeres til opgaver uden tæt kontakt til borgere.



### **Genbrug og genbehandling af værnemidler, som er mærket engangsudstyr**

Ved total mangel på værnemidler, kan dette være et nødvendigt alternativ.

Situationen vedr. covid-19 udvikler sig hele tiden. Det er derfor vigtigt at holde sig opdateres løbende på [nun.gl](http://nun.gl).