

Oversigt – Vacciner og injektionsprocedurer

Vaccine mod	Præparat	Injektion *	Cave / obs **	Hyppigste bivirkninger
Tuberkulose	BCG Børn <1 år: 0,05 ml Voksne og børn >1 år: 0,1 ml	Intradermalt Indgives langsomt på ydersiden af overarmen (øverste hudlag) ved fødslen. Injektionsstedet bør være utildækket. Kræver oplæring.	Immundefektsyndrom eller immunsuppressiv behandling. Patienten bør observeres 15 min. efter vaccinationen. Der bør ikke indgives andre vacciner i samme arm 3 mdr. efter vacc.	Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber. Lille, bleg blære på injektionsstedet efterfulgt af et lille, lokalt sår, der heler op og efter nogle måneder efterlader et lille, fladt ar.
Hepatitis B Hep B	Engerix B 0,5 ml.	Intramuskulært Spædbørn: foran på siden af låret Større børn: på ydersiden af overarmen.	Gives inden barnet forlader sygehuset Indeholder overfladeantigen af hepatitis B virus HBSAg fremstillet ved genteknologi.	Rødme, ømhed og hård infiltration ved injektionsstedet.
Difteri, tetanus, kighoste, polio, Hib Di-Te-Ki-Po-Hib	Pentavac 0,5 ml.	Intramuskulært Spædbørn: Foran på siden af låret	Allergi for formaldehyd. Fremadskridende neurologiske sygdomme.	Utilpashed, feber $\geq 38^{\circ}\text{C}$, rødme, hævelser og ømhed på injektionsstedet. Hovedpine, diarré, kvalme og opkastning.
Difteri, tetanus, kighoste, polio Di-Te-Ki-Po	Tetravac 0,5 ml.	Intramuskulært Større børn: på ydersiden af overarmen.	Se cave/obs. ovenfor.	Utilpashed, feber $\geq 38^{\circ}\text{C}$, ømhed, rødme, kløe og hævelse på injektionsstedet, under tiden ≥ 6 cm.
Pneumokok	Prevenar-13 0,5 ml.	Intramuskulært Spædbørn: Foran på siden af låret. Større børn: på ydersiden af overarmen.	Kapsel-materiale fra tretten pneumokoktyper, som er koblet til et protein, hvilket gør vaccinen virksom hos børn under to år.	Rødme, hævelse og smerter ved administrationsstedet. Nedsat appetit, opkastninger og diarré samt feber. Irritabilitet, gråd, døsigthed, urolig søvn
Mæslinger, fåresyge og røde hunde MFR	MMR VaxPro 0,5 ml.	Intramuskulært Spædbørn: foran på siden af låret. Større børn: på ydersiden af overarmen.	Allergi for neomycin og æg. Fructoseintolerans. Anamnese eller familieanamnese med kramper eller hjernelæsion.	Feber $> 39,5^{\circ}\text{C}$; i reglen fremkommer feber mellem 5. og 12. dagen. Udslæt eller mæslingelignende udslæt, sædvanligvis minimalt, men kan være universelt, fremkommer i reglen mellem 5. og 12. dagen. Lokal rødme. Nervøsitet.
Human Papilloma Virus (HPV)	Gardasil 9 0,5 ml (> 9 år)	Intramuskulært Større børn: på ydersiden af overarmen.		

*Se afsnit om injektionsteknikker

** Alle vacciner kan gives sammen med andre vacciner ved andet indstikssted.