



Nutaarsiasaaq Nyhed

Ny TB vejledning

I forlængelse af TB strategien 2017-21 er den grønlandske TB vejledning for sundhedsprofessionelle blevet opdateret med anbefalinger fra både internationale og nationale TB eksperter, heriblandt WHO, sundhedsvæsenet og samarbejdspartnere. Udover nedenstående fokus punkter, så er der i vejledningen udarbejdet et særligt afsnit om børn og unge, samt målrettede screeninger.

Brevdato: 07-12-2018
Sags nr. 2016 - 713
Dok. nr. 39

Postboks 120
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 51 92
Fax (+299) 32 51 30
E-mail: nun@nanoq.gl
www.nanoq.gl

Ændringer i forhold til forebyggelse

- BCG vaccinationen anbefales til alle børn, som er bosiddende i Grønland i mere end 3 måneder
- Børn under 5 år, som er husstandskontakter til smitsom TB, der er udelukket for aktiv TB, anbefales forebyggende behandling uanset IGRA (QuantiFERON) svar

Ændringer i forhold til diagnostik,

- IGRA (QuantiFERON) bruges fortsat til diagnostik af latent TB, men ikke til aktiv TB
- Ved TB udredning kombineres prøver til Centrallaboratorium og Statens Serums Institut (SSI), med 1 prøver til SSI til dyrkning og mikroskopi og 2 til TB PCR i centrallaboratorium.
- Ved 3 negative ekspektorater, hvor der fortsat er mistanke om TB sygdom, anbefales der 3 x ventrikelskyl eller induceret sputum ved inhalation af saltvand

Ændringer i forhold til behandling og isolation

- Alle med ekspektorat, som er positiv for TB PCR og / eller mikroskopi isoleres i 14 dage
- Der kan nu tilbydes en ny forebyggende TB behandling, som gives x 1 om ugen i 3 mdr, som DOT (direct observed therapy)

Fastholdelse

- Brug af kombinationspræparat med 4 stof behandling i de første 2 måneder af TB behandling
- Stort fokus på smitteopsporing
- Stort fokus på gennemførelse af behandling, hvor der anbefales at udarbejde en behandlingsplan i samarbejde med patienten
- Høj anmeldelses procent
- Screening for HIV ved TB diagnostik